

การติดต่อ

การติดต่อ อาจ เกิดขึ้นได้ โดยเชื้อไวรัสออกมาจบน้ำลายสัตว์ที่ติดเชื้อมาและเข้าสู่ร่างกายคน ทางบาดแผล ซึ่งพาหะอาจ กัด ข่วน เลีย หรือมีน้ำลายกระเด็นเข้าตา จมูก นอกจากนี้ เชื้ออาจติดต่อจากการกิน ถ้ามีบาดแผลภายในช่องปากหรือหลอดอาหาร ซึ่งจะพบกรณีสัตว์กินเนื้อตัวป่วย หรือที่ตายใหม่ๆ เข้าไป



ทำอย่างไรถ้าสัตว์เลี้ยงในบ้านมีอาการน่าสงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า

1. ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยงเป็นประจำทุกปี
2. ควรเลี้ยงสัตว์ในบริเวณที่มีรั้วรอบขอบชิด และห้ามปล่อยออกไปคลุกคลีกับสุนัขจรจัดนอกบ้าน
3. ห้ามเลี้ยงสุนัขจรจัดบริเวณหน้าบ้านเพราะจะเป็นตัวการในการแพร่เชื้อได้
4. ห้ามนำสุนัขจรจัดหรือสัตว์ที่ไม่ทราบประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามาเลี้ยงในบ้านเด็ดขาด

ทำอย่างไรถ้าสัตว์เลี้ยงในบ้านมีอาการน่าสงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า

1. คนในบ้านควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำลายสัตว์และห้าม
คลุกคลีหรืออย่าให้สัตว์กัดเด็ดขาด
2. ห้ามนำสัตว์ไปคลุกคลีหรือเล่นกับสัตว์อื่น
3. ควรจะทำการกักขังสัตว์ไว้เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรค



Scan เพื่ออ่านบนมือถือของคุณ

โรคพิษสุนัขบ้า หรือ โรคกลัวน้ำ

“หมากัดเล็กน้อย อย่าคอยท่า รีบหาหมอ”



โรคนี้ไม่มีทางรักษา

ให้หายได้ หากมีอาการแล้ว

เสียชีวิตทุกราย



สำนักอนามัยและสุขภาพสัตว์จังหวัดเพชรบุรี
โรงพยาบาลเพชรบุรี

งานสุขศึกษา

โรงพยาบาลท่า양าง จังหวัดเพชรบุรี

คนติดโรคพิษสุนัขบ้าทางไต่บัง

โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรงชนิดหนึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสชื่อ เรบีส ไวรัส ทำให้เกิดโรคได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น สุนัข แมว วัว ควาย ลิง กระจง กระรอก กระแต เต่า หมู ค้างคาว รวมถึงคนด้วย โดยเชื้อจะปนมาในน้ำลายสัตว์แล้วแพร่สู่คนและสัตว์อื่นปัจจุบันยังไม่มีทางรักษาหาย แต่สามารถป้องกันได้ ผู้ป่วยมักคงสภาพอยู่ได้นานไม่เกิน 1 สัปดาห์ และเสียชีวิตเนื่องจากอัมพาตของกล้ามเนื้อ และระบบ

ทางเดินหายใจ ในปัจจุบันยังไม่มียาอะไรที่จะรักษาโรคได้

ในประเทศไทยยังมียารายานการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าโดยสาเหตุหลักเกิดขึ้นจาก



อาการแสดงของโรค

มักเป็นการอักเสบสมองและเยื่อสมอง ในระยะ 2-3 วันแรก ผู้ป่วยจะปวดเมื่อยตามเนื้อตัว มีไข้ คันหรือปวดบริเวณรอยที่ถูกกัด ทั้ง ๆ ที่แผลอาจ



หายเป็นปกติแล้ว ต่อมาจะหงุดหงิด กระสับกระส่าย ตื่นเต้นไวต่อสิ่งเร้ารอบกาย ไม่ชอบแสง ลม มีน้ำลายไหล กล้ามเนื้อคอกระตุก เกร็งขณะพยายามกลืนอาหารหรือน้ำ ทำให้เกิดอาการ "กลัวน้ำ" ต่อมาจะเริ่ม เพ้อคลั่ง สลับกับอาการสงบ ชัก ผู้ป่วยบางราย อาจเป็น อัมพาต โดยมีอาการแขนขาอ่อนแรง หมดสติ และเสียชีวิตในที่สุด

การป้องกัน

การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ดีที่สุดคือ ระวังอย่าให้ถูกสุนัขกัดหรือแมวกัด เพราะการติดเชื้อ ส่วนใหญ่จะมาจากน้ำลายสัตว์ที่เป็นโรคอยู่แล้ว ที่สำคัญที่สุด คือ การเสริมภูมิคุ้มกันในสุนัข ซึ่งเป็นสัตว์นำโรคหลัก รวมทั้ง การควบคุม

