

การรักษา

ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกัน
เฉพาหรือยาฆ่าเชื้อเฉพา จะ
ทำการรักษาตามอาการ อาการ
ไม่รุนแรงหายได้เองใน 2-7 วัน
**อย่ากินยาแอสไพริน เพราะทำ
ให้เลือดออกในอวัยวะภายใน
ได้ง่ายขึ้น**



การป้องกัน

โดยทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

โดยใช้ **มาตรการ 3 เก็บ**

1. เก็บบ้านให้สะอาด
2. เก็บน้ำ ปิดภาชนะ ใส่น้ำ
ให้มิดชิด
3. เก็บขยะไม่ให้เป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุง

หญิงตั้งครรภ์
กลุ่มเสี่ยง
ไข้ซิกา



ป้องกันไม่ให้ยุงกัด นอนในมุ้ง

และทายากันยุง

หญิงตั้งครรภ์และเด็กเล็ก

ควรใช้สารป้องกันยุง

ที่สกัดจากธรรมชาติ

หลีกเลี่ยงการใช้สารทากันยุง

ที่มีส่วนประกอบของสารเคมี

หญิงตั้งครรภ์เสี่ยง “ไข้ซิกา”

Zika Virus Disease



สตรีมีครรภ์หากมีอาการสงสัย

ควรไปพบแพทย์

เพื่อตรวจสุขภาพ




งานลูกศึกษา

โรงพยาบาลท่า양 จังหวัดเพชรบุรี



โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika fever) เกิดจากการติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika Virus – ZIKV) โดยมีผู้กลายเป็นพาหะนำโรค เป็นอีกหนึ่งโรคอันตรายที่ส่งผลตรงต่อระบบสมองโดยเฉพาะเด็กในครรภ์ เมื่อได้รับเชื้อแล้วอาจรุนแรงถึงขั้นสมองผิดปกติ เช่น ศีรษะเล็กแต่กำเนิด แคระแกรน พัฒนาการช้า

อันตราย ของโรคไข้ซิกา ในหญิงตั้งครรภ์และเด็กทารก



อาจทำให้ทารกมีภาวะศีรษะเล็กแต่กำเนิด (Microcephaly) ในทารกแรกเกิด หรือผู้มีภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาท

อาการ

ระยะฟักตัวของโรคติดต่อเชื้อไวรัสซิกา (Zika Virus Disease) ตั้งแต่รับเชื้อกระทั่งแสดงอาการ ใช้เวลา 3-12 วัน (เฉลี่ย 4 -7 วัน)



สามารถติดต่อเชื้อไวรัสซิกาได้จากไหนบ้าง ?

สามารถติดต่อได้ทางช่องทางหลัก โดยการถูกยุงลายที่มีเชื้อไวรัสซิกา (Zika Virus Disease) กัด ส่วน



ช่องทางอื่น ๆ ที่สามารถเป็นไปได้คือการแพร่ผ่านทางเลือด เช่น การถ่าย

เลือดหรือจากแม่ที่ป่วยเป็นโรคติดเชื้อไวรัสซิกาสู่ทารกในครรภ์ ส่วนการแพร่ผ่านการมีเพศสัมพันธ์นั้น ยังมีรายงานเป็นจำนวนน้อย

“ควรป้องกันการถูกยุงลายกัดเป็นหลัก”

